

A close-up photograph of a person's arm showing a red, itchy rash characteristic of measles. A hand is shown touching the affected area. In the upper left, there is a green speech bubble containing the text '¿SABÍAS QUE...' and a lightbulb icon with a heart inside.

**¿SABÍAS
QUE...**

El sarampión se transmite por contacto estrecho con secreciones de una persona con sarampión, al toser, estornudar o exhalar.

Antes de viajar asegúrate de contar con tu esquema de vacunación completo. Vacunarse es la mejor manera de evitar contraer el sarampión o contagiarlo a otras personas.



¿SABÍAS QUE...



El sarampión es una enfermedad infecciosa, altamente contagiosa causada por un virus que puede ocasionar diversas complicaciones e incluso la muerte.

Antes de viajar asegúrate de contar con tu esquema de vacunación completo. Vacunarse es la mejor manera de evitar contraer el sarampión o contagiarlo a otras personas.





¡EL SARAMPiÓN ES MUY CONTAGIOSO!

**Se transmite cuando una
persona infectada respira,
tose o estornuda.**

El virus queda en el ambiente
y en las superficies por 2 horas.

El sarampión se puede prevenir a través de la vacunación con la vacuna triple viral (SRP) la cual
se encuentra disponible en todas las unidades de salud.





¡VACÚNATE **CONTRA EL SARAMPiÓN!**

El sarampión puede causar:

- Neumonía.
- Daño cerebral permanente.
- Sordera.
- Parto prematuro.
- Bebés con bajo peso al nacer.
- Muerte.**

El sarampión se puede prevenir a través de la vacunación con la vacuna triple viral (SRP) la cual **se encuentra disponible en todas las unidades de salud.**





¡VACÚNATE **CONTRA EL SARAMPiÓN!**

Síntomas del sarampión:

Fiebre alta.
Moqueo nasal.
Tos.
Ojos rojos.
Erupciones.

**Suele aparecer de 7 a 14 días
después de la infección**

El sarampión se puede prevenir a través de la vacunación con la vacuna triple viral (SRP) la cual
se encuentra disponible en todas las unidades de salud.





VACÚNATE **ANTES DE VIAJAR**

**Hay sarampión en muchos
lugares del mundo.**

Viajeros, niñas, niños y adultos que no saben si están vacunados, deben de recibir una dosis al menos 2 semanas antes de viajar.

El sarampión se puede prevenir a través de la vacunación con las vacunas triple viral (SRP) (niños y niñas a partir de 1 año hasta antes de los 10 años) y doble viral (SR), (a partir de los 10 años sin antecedente vacunal) las cuales se encuentran disponible en todas las unidades de salud.

A close-up photograph of a person's arm showing a red, bumpy rash characteristic of measles. A hand is pointing to the rash. Overlaid on the image is a green speech bubble with a lightbulb icon containing a heart, and a green rectangular box with text.

**¿SABÍAS
QUE...**



EL SARAMPIÓN ES MUY CONTAGIOSO

Una persona con sarampión puede infectar de 16 a 18 personas a su alrededor si no están vacunadas.

Acude a tu unidad de salud y recuerda presentar tu Cartilla Nacional de Salud.

¡Las vacunas son gratuitas!



Esquema de vacunación

Vacuna triple viral (SRP) sarampión, parotiditis y rubéola



Niñas y niños nacidos a partir de julio del 2020.

Niñas y niños nacidos antes de julio del 2020

Primera dosis de SRP al año de edad.

Primera dosis de SRP al año de edad.

2da dosis a los 18 meses.

2da dosis a los 6 años de edad.

Acude a tu unidad de salud y recuerda presentar tu Cartilla Nacional de Salud.

¡Las vacunas son gratuitas!

